

قياس معرفة واتجاهات الممرضين الأردنيين العاملين في وحدات العناية الحثيثة تجاه مرضى السكتة الدماغية.

إعداد الطالبة: إسلام عبد الكريم اللصاصمة

بإشراف

الدكتورة مروة البرماوي

الملخص:

خلفية البحث: إنّ السكتة الدماغية مرضٌ مدمرٌ، وتعتبر سبباً رئيسياً مرتبطاً بالمشاكل العصبية و دخول الكثير من الأشخاص إلى المستشفيات في مختلف أنحاء العالم. إن نقص المعرفة والاتجاهات لدى ممرضى وحدات العناية الحثيثة حول السكتة الدماغية بشكل عام والمعرفة المحدودة للعوامل الخطرة والعلامات والأعراض نتيجة السكتة الدماغية مما يؤدي إلى التأخر في العلاج المبكر للسكتة الدماغية بالإضافة إلى عدم الالتزام بإعادة التأهيل خلال مرحلة المتابعة. لا يزال هنالك القليل من المعرفة واتجاهات بخصوص تأثير هذه العوامل على التعامل مع مرضى السكتة الدماغية لدى ممرضى وحدة العناية الحثيثة الأردنيين، وبالتالي، فإن هنالك حاجة ملحة لإجراء دراسة تتناول تأثير هذه العوامل من أجل تعزيز التعامل مع مرضى السكتة الدماغية وتحسين مخرجات الرعاية التمريضية.

الهدف: لقد هدفت هذه الدراسة إلى قياس المعرفة واتجاهات لدى الممرضين الأردنيين العاملين في وحدات العناية الحثيثة نحو مرضى السكتة الدماغية.

الطريقة: تم استخدام تصميم المقارنة الوصفية لقياس المعرفة واتجاهات لدى الممرضين الأردنيين العاملين في وحدات العناية الحثيثة بالنسبة إلى مرضى السكتة الدماغية في المستشفيات الأردنية. لقد تم جمع البيانات من ممرضى وحدات العناية الحثيثة الأردنيين العاملين في سبع مستشفيات تشمل؛ خمس مستشفيات خاصة ومستشفيان حكوميان، تم اختيار ممرضى وحدات العناية الحثيثة ضمن معايير محددة. قد طلب من المشاركين المؤهلين استكمال استبيان حول المعرفة واتجاهات، بالإضافة إلى تعبئة استبيان الديموغرافية. وأجريت الإحصاءات الوصفية واستنتاجيه باستخدام برنامج (SPSS).

النتيجة: لقد شارك (200) من ممرضى وحدات العناية الحثيثة من مستشفيات حكومية وخاصة ضمن هذه الدراسة, لقد أظهر الممرضون ضمن هذه الدراسة معرفة ضعيفة / منخفضة واتجاهات سلبية على مقياس الدراسة. لقد كان هنالك فروق ذات دلالة إحصائية بين الممرضين حسب القطاع (العام والخاص) على المقياسين الدراسة ($P < 0.05$). فيما حقق الممرضون الذكور متوسط الدرجات أعلى على مقياس اتجاهات ($P = 0.029$). هنالك علاقة سلبية بين المعرفة وسنوات ممارسة التمريض ضمن (ER) أو (ICU) ($P = 0.013$), في حين كان هنالك علاقة ارتباط إيجابية بين اتجاهات وسنوات ممارسة التمريض ضمن (ER) أو (ICU) ($P = 0.019$).

الاستنتاج: يبدو بأن مقياس المعرفة والاتجاهات لدى الممرضين في وحدات العناية الحثيثة في المستشفيات الأردنية نحو مرض السكتة الدماغية منخفضة جداً, يبدو بأن الممرضين ضمن وحدات العناية الحثيثة يمتلكون معلومات مقبولة, ولكنها غير ملائمة لتعزيز الإدراك حول السكتة الدماغية بالشكل الصحيح.

هنالك فجوة يجب تجسيدها من خلال تخطيط وتطبيق البرامج التعليمية والتوجيهية, والتي تركز على ممرضى المستشفيات وعلى قطاعات المجتمع من أجل تحسين التركيز والخبرة المرتبطة بالسكتة الدماغية, مما يساهم في تحسين التعامل مع السكتة الدماغية والتقليل من تأثيرها في الأردن.