

العلاقة بين الاضطراب الناجم عن توتر الصدمة الثانوية والأداء السريري لمرضى الطوارئ

الأردنيين

إعداد
الطالبة/ ايناس بني صالح

المشرف
الدكتورة/ مها صبح

جامعة الزيتونة الأردنية، 2023

تاريخ المناقشة 2023/01/12م

الملخص

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من العلاقة بين إجهاد الصدمة الثانوية وأداء التمريضي بين ممرضى قسم الطوارئ الأردنيين. أجريت هذه الدراسة باستخدام تصميم ارتباط وصفي ، حيث شاركت في الدراسة عينة من 251 من ممرضى قسم الطوارئ. أظهرت النتائج مستويات شديدة من الإجهاد الثانوي الناتج عن الصدمات لدى الممرضين الاردنيين في اقسام الطوارئ (متوسط = 57.9 , انحراف معياري = 14.94) , وكان مقياس التجنب الأعلى تصنيفاً (متوسط = 23.52 , انحراف معياري = 6.79) . أظهرت النتائج أيضاً أن مستويات أداء التمريض أقل من المتوسط (متوسط=27.48 , انحراف معياري =9.36) مع تصنيف مقياس الأداء العقلي الأدنى (متوسط = 5.82 , انحراف معياري = 2.69) . كانت هناك علاقات سلبية ذات دلالة إحصائية بين إجهاد الصدمة الثانوية وأداء التمريضي (معامل ارتباط = -0.77 , القيمة الاحتمالية = 0.001) , كما كان مؤشر كتلة الجسم (قيمه احتماليه اقل من 0.001) ، والتدخين (قيمه احتماليه=0.004) والامراض المزمنة (قيمه احتماليه اقل من 0.001) , والعمل الاضافي (قيمه احتماليه = 0.002) والنتيجة الإجمالية للإجهاد الناتج عن الصدمة الثانويه (قيمه احتماليه اقل من 0.001) من العوامل التي تؤثر على الاداء التمريضي . بالنظر إلى هذه

النتائج ، يجب تنفيذ البرامج والإجراءات الخاصة بمرضات قسم الطوارئ لعلاج ومنع الإجهاد الثانوي الناتج عن الصدمات وتحسين أدائهم ، مما يضمن في المقابل جودة عالية وأمنة لرعاية المرضى.

الكلمات المفتاحية: صدمة الاجهاد الثانوي , الاداء التمريضي , قسم الطوارئ