

العلاقة بين الحالة المعرفية و نوعية الحياة لدى الأشخاص المصابون بتضيق الشريان السباتي في الاردن: دراسة ارتباطية وصفية

إعداد

اية محمد نمر عبيد

المشرف

د. محمد منور النعيم

جامعة الزيتونة الأردنية، ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤

الملخص

الهدف: هدفت هذه الدراسة إلى فحص العلاقة بين الحالة المعرفية ونوعية الحياة لدى المرضى الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي. الطرق: تم استخدام الدراسة الارتباطية الوصفية المقطعية. تم تسجيل عينة ملائمة مكونة من 140 مريضاً في مستشفى البشير ومركز الملكة علياء وأمراض وجراحة القلب. تم جمع البيانات باستخدام الاستبيانات المبلغ عنها ذاتياً. النتائج: معظم المرضى الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي لديهم تضيق متوسط إلى شديد (<50%). غالبية المشاركين يعانون من ضعف إدراكي معتدل (ن = 117، 83.6%)، وضعف نوعية الحياة الإجمالية (M = 52.9، SD = 13.97). تم العثور على علاقة إيجابية كبيرة بين الحالة المعرفية للمرضى ونوعية الحياة الشاملة (ص = 0.39، P=0.001). علاوة على ذلك، كان عمر المرضى والمستوى التعليمي ونوع التأمين مرتبباً بشكل كبير بحالتهم المعرفية ونوعية حياتهم بشكل عام (P < 0.05). الخلاصة: المرضى الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي المعتدل إلى الشديد يظهرون عادة ضعف إدراكي معتدل وسوء نوعية الحياة. ينبغي إعطاء الأولوية لإجراء المبادرة والتقييم المركز للمرضى الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي. تحفيز الممرضات والأطباء لتقييم الحالة المعرفية وجودة الحياة بين

المرضى الداخليين والخارجيين الذين يعانون من تضيق الشريان السباتي، حتى قبل أي تدخلات. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لإنشاء تدخلات جراحية تهدف إلى تقليل احتمالية التدهور المعرفي مع السعي في الوقت نفسه إلى تحسين الجودة العامة للحياة لهؤلاء المرضى. الكلمات المفتاحية: تضيق الشريان السباتي. الحالة المعرفية الأردن؛ جودة الحياة.